Atomoksetiini, kova kapseli (Atomoxetin®, Atomoxetine®)

Käyttöaihe

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoito. Lääkehoidon tavoitteena on lievittää oireiden aiheuttamaa haittaa ja parantaa toimintakykyä. Hoidolle kannattaa asettaa konkreettinen tavoite, jotta hoidon onnistumista voidaan mitata. ADHD:n asianmukainen hoito voi parantaa merkittävästi opiskelu-, työ- ja toimintakykyä.

Vaikutustapa

Atomoksetiini voimistaa välittäjäaine noradrenaliinin vaikutusta aivojen hermopäätteissä, mikä saa aikaan oireita lievittävät vaikutukset (mm. tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn parantuminen, rauhattomuuden väheneminen). Lääkkeellä ei ole stimulanttien kaltaisia stimuloivia tai euforisoivia vaikutuksia.

Lääkehoidon vaikutukset alkavat näkyä yleensä 2–6 viikon kuluessa lääkkeen aloituksesta. Vaikutus voi voimistua 8.–12. hoitoviikkoon saakka. Lääkkeen vaikutusaika on 24 tuntia.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus vaihtelee potilaan iän, painon ja yksilöllisen vasteen mukaan. Lääkehoito aloitetaan pienellä annoksella ja tarpeen mukaan annosta nostetaan vähitellen. Lääkkeen annostelu tapahtuu kerran tai kaksi kertaa vuorokaudessa.

Lääkehoito toteutetaan pienimmällä mahdollisella vuorokausiannoksella, jolla saavutetaan riittävä oireiden hallinta. Käytön lopetus tehdään lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Kapselit tulee niellä kokonaisina, eikä niitä saa avata tai pureskella. Kapselit voidaan ottaa ruoan kanssa tai tyhjään mahaan.

Tämä lääke on reseptilääke, joka on tarkoitettu vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi.

Jos unohdat ottaa lääkkeen

Jos unohdat ottaa lääkeannoksen, ota se mahdollisimman pian, mutta lääkärin määräämää kokonaisvuorokausiannosta ei kuitenkaan saa ylittää minään vuorokautena (24 h). Älä ota kaksinkertaista annosta korvaamaan unohtunutta kerta-annosta.

Käytössä huomioitava

- Lääkitys saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn (väsymys, uneliaisuus, huimaus). Noudatettava varoivaisuutta, kunnes lääkkeen yksilöllinen vaikutus ajokykyyn on selvillä.
- Lääkehoidon aikana tulee seurata hoitovastetta, verenpainetta ja sykettä, painoa, ruokahalua ja psyykkistä vointia.
- Kofeiinin ja nikotiinin käyttöön on syytä kiinnittää huomiota ja vähentää käyttöä etenkin, jos koet häiritsevää sydämen tiheälyöntisyyttä, ahdistuneisuutta tai päänsärkyä.

Haittavaikutukset

- Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Mahdolliset haittavaikutukset ilmenevät usein lääkehoidon alussa ja ne saattavat lievittyä tai hävitä kokonaan lääkehoidon jatkuessa.
- Tavallisia haittavaikutuksia ovat ruokahalun heikentyminen, painon lasku, päänsärky, vatsakipu, unettomuus tai uneliaisuus, suun kuivuminen, masennus, väsymys, ärtyneisyys, ahdistuneisuus, huimaus, pahoinvointi, lehahtelu, kuumat aallot, ummetus, oksentelu, ihottuma, hikoilu, kuukautiskivut, erektio- ja ejakulaatiohäiriö, eturauhasen tulehdus ja nivuskipu miehillä. Jos aikuispotilas valittaa virtsaumpea taikka heikentynyttä virtsan tuloa, on tätä pidettävä mahdollisesti atomoksetiinihoitoon liittyvänä haittana.

Milloin yhteys hoitavaan tahoon? (Hätätilanteessa soitto 112)

- Jos oireet pahenevat tai ilmenee vakavia haittavaikutuksia (mainittu pakkausselosteessa).
- Mikäli kapselin sisältöä joutuu silmään, tulee silmä huuhdella välittömästi vedellä ja sen jälkeen ottaa välittömästi yhteyttä päivystykseen. Atomoksetiini ärsyttää silmiä. Kapseleita ei tule avata.
- Mikäli ilmenee itsetuhoisia ajatuksia tai maksahaittoja (esim. ihon tai silmien keltaisuus, tumma virtsa)

Yhteisvaikutukset

- Kaikkien muiden lääkkeiden, ravintolisien sekä luontaistuotteiden samanaikaisesta käytöstä on keskusteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.