Atsasitidiini (Vidaza ®)

Atsasitidiini on lääkeaine, joka kuuluu antimetaboliittien lääkeryhmään. Se vaikuttaa estämällä pahanlaatuisten solujen kasvua.

Atsasitidiini- hoito

Atsasitidiinia annetaan ihonalaisina pistoksina kerran päivässä 5–7 päivän jaksoina 4–5 viikon välein. Pistos voidaan antaa ihon alle reiteen, vatsaan tai käsivarren yläosaan.

Haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, myös atsasitidiini voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Niitä ei kuitenkaan esiinny kaikilla.

Tavallisimmat haitat:

pahoinvointi

- *ennaltaehkäisevä* lääkitys yleensä tarpeellinen

väsymys

ripuli tai ummetus

pistoskohdan reaktiot

Pistoskohdan reaktiot

Atsasitidiini- injektion pistoskohdat voivat ärtyä. Ne voivat olla punoittavia, kipeitä ja kutisevia. Yleensä pistospaikat paranevat muutaman päivän jälkeen.
Hoitohenkilökunta antaa sinulle ohjeita ihon paikallishoidosta.

Hematologian pkl p.014-2692950