

Baxter- infuusiopumppu syöpälääkehoidoissa

Teille on suunniteltu aloitettavaksi syöpälääkehoito, joka toteutetaan infuusiopumpun avulla. Infuusiopumpulla annostellaan 5-fluorourasiilia useamman vuorokauden aikana. Pumppu mahdollistaa hoidon toteuttamisen osittain kotioloissa ja teidän ei tarvitse tiputuksen takia yöpyä sairaalan vuodeosastolla. Hoidon aikana saatte elää lähes normaalisti oman rytminne mukaan.

Hoito aloitetaan sairaalassa, jossa Teille annetaan muut hoitoonne kuuluvat lääkkeet ennen infuusiopumpun asennusta. Infuusiopumpun letkusto kiinnitetään laskimoportin neulaan. Letkuston päässä oleva virtaussäädin teipataan ylävatsan iholle. Virtaussäädin annostelee lääkettä ihon lämpötilan mukaan. Teille annetaan vyölaukku, jossa infuusiopumppu kulkee kätevästi mukananne hoidon ajan.

Kun infuusiopumppu on tyhjentynyt sovittun ajan kuluessa, poistetaan se joko Sairaala Novan hoitokeskuksessa, osastolla tai terveystieteiden keskuksessa. Joissain tapauksissa voitte poistaa laskimoportin neulan myös kotona. Neulan poistamiseen saatte ohjeet hoitoa aloittaessa. Neulaa ei saa poistaa kotona, mikäli asiasta ei ole erikseen sovittu. Tyhjentynyt infuusiopumppu letkustoineen toimitetaan hoitopaikkaan seuraavaan hoitoon tullessa.

Ihon lämpötila vaikuttaa pumpun tyhjenemiseen, tyhjeneminen voi olla parituntia lyhyempi tai pidempi kuin oletettu hoidon kesto-aika. Pumppu on tyhjä silloin, kun sen muovikuoren sisällä oleva ruskea lääkesäiliö on kapeutunut suoraksi letkuksi. Vaikka pumppu olisi jonkin aikaa tyhjänä ennen sen poistamista, siitä ei aiheudu teille mitään haittaa. Laskimoportin neula poistetaan laskimoportista lääkehoidon päätyttyä. Tämän jälkeen portin kanssa voitte elää ja toimia ilman rajoituksia kuten aiemminkin.

Katso Tyksissä tehty video [Lääkepumpun poistosta infuusioportista](#) , se opastaa asiassa enemmän.

Hoidon aikana

Suojaa laskimoportin neula kastumiselta.

Älä oleile suorassa auringonpaisteessa tai käy saunassa hoidon aikana (lämpö lyhentää tiputusaikaa)

Suojaa virtaussäädin kylmältä pukeutumalla lämpimästi (kylmyys pidentää tiputusaikaa)

Lääkesäiliö tyhjenee niin hitaasti, ettei se ole välittömästi silmin havaittavissa. Lääkesäiliön tyhjenemisen huomaa pikkuhiljaa hoidon aikana.

Mikäli ette huomaa lääkesäiliön tyhjenevän, ottakaa yhteyttä arkisin Hoitokeskukseen p. 014-269 1034 tai muina aikoina Syöpä- ja verisairauksien osastolle p. 014-269 3716