KESKI-
SUOMEN
HYVINVOINTI-
ALUE

Bortetsomibi (Velcade®)

Bortetsomibi on proteasomiestäjiin kuuluva lääke. Se tuhoaa pahanlaatuisia soluja estämällä solujen kasvua hillitsevien säätelyproteiinien pilkkoutumista.

Miten bortetsomibi- valmistetta annetaan?

Bortetsomibi annostellaan ihonalaisena injektiona. Hoitoon yhdistetään tavallisesti myös muita lääkeaineita, esim. kortisonia (Dexametason).
Bortetsomibia annetaan yleensä kerran viikossa, 3–4 pistosta neljän viikon hoitojaksossa. Lääke voidaan annostella myös muulla tavalla lääkärisi tekemän hoitosuunnitelman mukaan.

Yhteisvaikutuksia

Suuria vihreän teen annoksia tulee välttää hoidon aikana, koska sen sisältämät polyfenolit voivat estää antituumorivaikutusta. Samoin C- vitamiinia ei tule ottaa samanaikaisesti.

Haittavaikutukset

Kuten kaikista lääkeaineista, myös bortetsomibista voi aiheutua haittoja
Jotkut henkilöt kokevat haittoja enemmän kuin toiset. Kerro kokemistasi haitoista hoitohenkilökunnalle. Haittojen varhainen tunnistaminen ja hoitaminen voivat lieventää oireita ja estää niitä pahenemasta. Hematologian pkl, soittoaika ma-pe klo 8–12 puh. 014 269 2950

TAVALLISIMMAT HAITAT:

** UMMETUS, RIPULI*
** VERIARVOMUUTOKSET*
** TUNNOTTOMUUS, PISTELY KÄSISSÄ JA JALOISSA (NEUROPATIA)*
**PISTOSPAIKAN KIPU JA PUNOITUS*