

Bulkamid-hoito

Bulkamid-injektio hoitoa käytetään naisten ponnistusvirtsankarkailun hoitoon. Se lisää virtsaputken ympäristön tukea nostaen virtsaputken sisäistä painetta ja estäen ponnistuksessa tapahtuvaa karkailua.

Valmistautuminen

Käy antamassa virtsanäyte viikko ennen toimenpidettä, lähete on valmiina laboratoriossa. Virtsatietulehduksen aikana hoitoa ei voi antaa.

Jos sinulla on verenhennuslääke kuten Marevan, Clopidogrel, Xarelto, Eliquis, Pradaxa, Plavix, Primaspan, Aspirin, Disperin tai vastaava käytössä ja et ole saanut ohjeita tautuksesta hoitoa suunniteltaessa, ota yhteys hoitavaan yksikköön, katso numero alla.

Toimenpideaamuna voit syödä ja juoda normaalisti, sekä ottaa lääkkeitä. Suorita huolellinen alapesu kotona ennen toimenpiteeseen lähtöä.

Toimenpiteen suorittaminen

Ennen toimenpidettä virtsaputken ulkoaukko ympäristöineen pestään ja virtsaputkeen laitetaan puuduttavaa geeliä. Tämän jälkeen virtsaputkeen viedään ohut tähyistin ja Bulkamid ruiskutetaan 3-4 eri kohtaan virtsaputken ympärille.

Toimenpiteen jälkeen saat juomista, 2-3 tunnin päästä saat virtsata ja jäännösvirtsamäärä mitataan ultraäänellä alavatsan päältä. Jos rakko tyhjenee hyvin, pääset kotiin, joskus tarvittaessa tämä tarvitsee toistaa.

Toimenpiteen jälkeen kotona

Hoidon vaikutus tulee esiin melko pian ja vaikutus voi kestää useamman vuoden. Mikäli virtsankarkailu helpottuu, mutta ei kokonaan lopu, voi toimenpiteen uusida 2 kuukauden kuluttua. Ajan voi varata alla olevasta numerosta.

Toimenpiteen jälkeen voi esiintyä verivirtsaisuutta, kirvelyä virtsatessa tai tihentynyttä virtsaamistarvetta 1-2 vrk:n ajan. Ensimmäisen vuorokauden ajan on syytä juoda normaalia enemmän ja virtsata usein. Myös virtsaamisvaikeutta voi toimenpiteen jälkeen esiintyä. Mikäli et kykene virtsaamaan, ota yhteys hoitavaan yksikköön.

Yhteystiedot

Naistentauti- ja äitiysyksikkö P.014 269 1023 arkisin klo 8-14, päivystysaikana synnytysvastaanotto P. 014 269 1204