

# Dapson

Dapsonin® vaikuttava aine dapsoni on sulfonamidien ryhmään kuuluva antibakteerinen lääke. Sitä käytetään erilaisten ihosairauksien, kuten ihokeliakian ja muiden rakkulatautiin, HS-taudin, vaskuliittien ja punahukan hoitoon. Lääkkeen teho perustuu sen kykyyn hillitä valkosolujen välittämää tulehdusreaktiota.

## Käyttö

Dapson on kerran päivässä otettava tabletti. Joskus annosta harvennetaan joitakin kertoja viikossa otettavaksi. Aloitusannos on yleensä 50-100 mg/vrk ja hoidon edetessä annosta saatetaan nostaa tai vähentää tehoa ja sivuvaikutuksia seuraten.

## Haittavaikutukset

Dapson voi aiheuttaa anemioita. Harvinaisemmat haittavaikutukset ovat vaikutus maksa-arvoihin, iho-oireet, psyykkiset häiriöt, neuropatia sekä lievät suolisto-oireet.

Lääkkeiden haitat ilmenevät useimmiten hoidon alussa ja voivat hoidon jatkuessa lievittyä tai hävitä kokonaan.

## Seuranta

Verenkuvaa sekä maksan ja munuaisten toimintaa seurataan verikokeilla lääkityksen aikana. Seurantaverikokeita otetaan 3, 6 ja 12 vko kohdalla lääkkeen aloituksesta ja tämän jälkeen 3-6 kk välein.

## Raskaus ja imetys

Lääkäri arvioi, onko käyttö mahdollista raskauden ja imetyksen aikana.

## Huomioitavaa

Osa sulfa-allergisista potilaista voi saada allergisia oireita myös Dapsonista (ristiallergia).

Dapson lääkitystä ei tarvitse tauottaa esimerkiksi infektion tai toimenpiteiden ajaksi.

Dapson on erityislupavalmiste, eli sillä ei ole Suomessa myyntilupaa ilman Fimean myöntämää erityislupaa. Erityislupavalmistetta potilaalle määräävä lääkäri laatii Fimeaan lähetettävän hakemuksen ja tämä toimitetaan sähköisesti potilaan käyttämään apteekkiin. Apteekki puolestaan hakee erityislupaa potilaan pyynnöstä Fimeasta. Apteekki ottaa erityislupahakemuksen käsittelystä hinnan. Voit ostaa lääkettä reseptin voimassaoloaikana vain siitä apteekista, joka haki erityisluvan. Erityislupa on potilaskohtainen ja voimassa vuoden myöntämispäivästä.