

إرشادات الدواء الأولي للمرضى البالغين

يتم استخدام الدواء الأولي لتهديئة المريض بسبب الخوف من علاج الأسنان و / أو إجراء أكثر تطلبًا.

قبل الدواء الأولي

يجب عدم تناول الطعام لمدة 4 ساعات وعدم الشرب لمدة ساعتين (يجب عدم شرب عصير الليمون الفردوسي قبل أو بعد - العملية)

تشكل بعض الأدوية أو الأمراض عقبة أمام الاستخدام الآمن للدواء الأولي. يرجى إخبار طبيب أسنانك عن الأدوية والأمراض والحساسية قبل الإجراء.

لا يمكن استخدام الدواء الأولي إذا كان التنفس لا يمر عبر الأنف، على سبيل المثال، أثناء التهاب الجهاز التنفسي

ساعة بعد العملية 24

لا تشرب الكحول
يزيد الكحول (بما في ذلك البيرة) من تأثير المواد المرهقة.

لا تقد السيارة ولا تستخدم آلات العمل

لا ينصح باتخاذ قرارات مهمة أو توقيع العقود

يُرجى الهدوء والاسترخاء بعد العملية. يحظر ممارسة الهوايات والرياضات التي تتطلب السرعة. يجب أيضًا تجنب صعود السلالم والمشي المفرط.

يتم إعادة المريض إلى بيته مع مرافق. حتى سائق سيارة الأجرة يعتبر مرافقًا. يجب أن يكون هناك مشرف في المنزل لسلامة المريض.

إذا كنت تعاني من صعوبة في التنفس، أو نزيف استثنائي، أو غثيان أو قيء، أو إذا كنت تعتقد أن الموقف غير واضح، فيرجى الاتصال برقم حجز مواعيد علاج الأسنان 116 117 أو بقسم الطوارئ