

Glomerulusten suodatusnopeuden mittaaminen (GFR)

Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoitus on selvittää munuaisten toimintaa.

Tutkimukseen valmistautuminen

Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda normaalisti sekä ottaa käytössäsi olevat lääkkeet.

Puoli tuntia ennen tutkimusta sinun tulee juoda nesteitä (esim. vettä tai mehua) n. 2-4 dl (10 ml/paino-kg).

Tutkimuksen kulku

Tutkimusaine pistetään kyynärtaipeen laskimoon. Tämän jälkeen otetaan verinäytteet 1,5, 2,5, 3,5 ja 4,5 tunnin kuluttua.

Tutkimusaineen antamista varten laitetaan suonikanyyli toiseen käteen (ensisijaisesti kyynärtaipeeseen) ja verinäytteet otetaan toisesta kädestä näytteenottoneulalla.

Väliajoilla voi halutessaan poistua sairaalasta tai odottaa odotusaulassa.

Tutkimusaineesta ei tule sivuvaikutuksia, eikä se aiheuta rajoituksia itselle tai ympäristölle.

Tutkimuksen kesto

Tutkimukseen tulee varata aikaa noin viisi tuntia.

Huomioitavaa

Ilmoittakaa pituus ja paino noin 1 viikkoa ennen tutkimusta puh. (014) 269 1263

Lapsipotilaille suonikanyylit laitetaan tarvittaessa lastentautien poliklinikalla ennen tutkimuspaikalle saapumista.

Tutkimuspaikka

Kliininen fysiologia ja isotooppitutkimukset, 1.kerros, Keski-Suomen Sairaala Nova. Sisäänkäynti 2.

Ilmoittaudu tutkimukseen viimeistään 15 minuuttia ennen tutkimusaikaa 1.kerroksessa L-lohkon itseilmoittautumisautomaatilla.

Jos on kysyttävää tai tulee äkillinen este, ota yhteyttä ma-to klo 7-15 ja pe 7-13 puh. 014 269 1263