Guanfasiini, depottabletti (Intuniv®, Paxneury®)

Käyttöaihe

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoito 6–17-vuotiailla, kun stimulantit eivät ole soveltuneet potilaalle, potilas ei ole sietänyt stimulantteja tai stimulantit eivät ole olleet tehokkaita. Lääkehoidon tavoitteena on lievittää oireiden aiheuttamaa haittaa ja parantaa toimintakykyä. Hoidolle kannattaa asettaa konkreettinen tavoite, jotta hoidon onnistumista voidaan mitata. ADHD:n asianmukainen hoito voi parantaa merkittävästi opiskelu-, työ- ja toimintakykyä.

Vaikutustapa

Guanfasiini vaikuttaa normalisoivasti aivojen viestintäjärjestelmiin, jotka ovat yhteydessä ADHD:n oireisiin. Lisäksi se vähentää sympaattisen hermoston aktivaatiota. Lääkitys voi parantaa keskittymiskykyä sekä vähentää impulsiivisuutta ja yliaktiivisuutta. Lääkkeellä ei ole stimulanttien kaltaisia keskushermostoa stimuloivia tai euforisoivia vaikutuksia.

Lääkehoidon vaikutukset alkavat näkyä yleensä 1–3 viikon kuluessa lääkkeen aloituksesta. Lääkkeen vaikutusaika on 24 tuntia.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus vaihtelee potilaan iän, painon ja yksilöllisen vasteen mukaan. Lääkehoito aloitetaan pienellä annoksella ja tarpeen mukaan annosta nostetaan vähitellen.

Lääkehoito toteutetaan pienimmällä mahdollisella vuorokausiannoksella, jolla saavutetaan riittävä oireiden hallinta. Lääkehoitoa ei tule keskeyttää omin päin, sillä tämä voi aiheuttaa vakavia haittoja. Lääkkeen lopetus tehdään lääkärin ohjeen mukaan asteittain annosta pienentäen.

Lääkkeen ottaminen

Tabletit otetaan kokonaisina nesteen kanssa joko ruuan kanssa tai tyhjään mahaan. Älä ota lääkettä hyvin rasvaisen ruuan kanssa, sillä rasvainen ruoka lisää guanfasiinin imeytymistä. Tabletteja ei saa jakaa, murskata tai pureskella, sillä se vaikuttaa tabletin toimintaan. Lääke otetaan kerran vuorokaudessa, joko aamuisin tai iltaisin.

Tämä lääke on reseptilääke, joka on tarkoitettu vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi.

Jos unohdat ottaa lääkkeen

Jos annos unohtuu, odota seuraavaan lääkkeenottoaikaan ja ota annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvaamaan unohtunutta annosta.

Jos annoksia jää välistä kaksi tai useampia, ota yhteyttä hoitavaan tahoon.

Käytössä huomioitava

- Lääkehoidon aikana tulee välttää alkoholin käyttöä (huomioi myös mahdollinen ruoan tai lääkkeiden sisältämä alkoholi), sillä yhteiskäyttö saattaa voimistaa keskushermostoon kohdistuvia vakavia haittavaikutuksia.
- Lääkitys saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn (väsymys, uneliaisuus, huimaus). Näitä vaikutuksia ilmenee etenkin hoidon alussa, mutta niitä voi esiintyä harvemmin myös hoidon jatkuessa. Tämä on hyvä huomioida myös polkupyörällä ajaessa.
- Lääkehoidon aikana tulee seurata hoitovastetta, verenpainetta ja sykettä, painoa, ruokahalua ja psyykkistä vointia.

Haittavaikutukset

- Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Mahdolliset haittavaikutukset ilmenevät usein lääkehoidon alussa ja ne saattavat lievittyä tai hävitä kokonaan lääkehoidon jatkuessa.
- Tavallisia haittavaikutuksia ovat uneliaisuus, päänsärky, väsymys ja vatsakipu. Muita yleisiä haittavaikutuksia ovat heikentynyt ruokahalu, oksentelu, ripuli, ummetus, suun kuivuminen, ihottuma, masennus, ahdistuneisuus, ärtyneisyys, unettomuus, painajaiset, alentunut verenpaine, sydämen harvalyöntisyys, huimaus, pyörtyminen ja yökastelu. Guanfasiini voi myös aiheuttaa ruokahalun lisääntymistä ja siihen liittyvää painon nousua.

Milloin yhteys hoitavaan tahoon? (Hätätilanteessa soitto 112)

- Jos oireet pahenevat tai ilmenee vakavia haittavaikutuksia (mainittu pakkausselosteessa).
- Jos unohdat ottaa lääkkeen niin, että lääkeannoksia jää välistä kaksi tai useampia.
- Mikäli ilmenee merkittävää huimausta, pyörtyilyä tai poikkeuksellista väsymystä. Lääkehoidon alussa tyypillisesti ilmenevä lievä väsymys on kuitenkin normaalia.

Yhteisvaikutukset

- Kaikkien muiden lääkkeiden, ravintolisien sekä luontaistuotteiden samanaikaisesta käytöstä on keskusteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
- Greippimehua tulee välttää, koska yhteiskäytössä guanfasiinialtistus suurenee.
- Luontaistuotteista mäkikuisma voi heikentää guanfasiinin tehoa, yhteiskäyttöä tulee välttää.