

Лучевая терапия при гинекологическом раке

Лечение проводится по индивидуально составленному плану.

Эффект лучевой терапии локальный.

Подготовка к моделированию планирования дозы

В мочевом пузыре всегда должно быть одинаковое количество мочи

- утром опорожните прямую кишку с помощью миниатюрной клизмы, которую можно приобрести в аптеке, например, Microlax
- помочитесь за 1 час до визуализации и выпейте 2 стакана воды (больше не пейте)
- **после этого не мочитесь до визуализации (не более часа!)**

Подготовка к лучевой терапии каждый день

- **в мочевом пузыре всегда должно быть одинаковое количество мочи**
- помочитесь за 1 час до лучевой терапии и выпейте 2 стакана воды (больше не пейте)
- **после этого не мочитесь до визуализации (не более часа!)**
- следите за тем, чтобы кишечник работал ежедневно. При необходимости помощь в лечении запора можно получить в аптеке. Миниатюрную клизму (Microlax) использовать каждый день не рекомендуется, при необходимости можно получить инструкции по ее применению у медсестры.

Побочные эффекты

Лучевая терапия может вызывать побочные эффекты, которые носят индивидуальный и проходящий характер:

- диарея, запор, метеоризм, раздражение ануса
- проблемы с мочеиспусканием
- раздражение кожных складок и на сгибах кожи
- пересыхание слизистых оболочек

Рекомендации по лечению побочных эффектов

Сообщите медсестре о симптомах для получения дальнейших инструкций по лечению. Вы можете лечить диарею, запор и метеоризм лекарствами, которые можно приобрести в аптеке без рецепта, если Ваш врач не выписал Вам рецепт на лекарство.

При необходимости Вы также можете обратиться к врачу.