

## Laajennushoidon eli dilataation jälkeen

Sinulle on tähystyksen yhteydessä tehty laajennus eli dilataatio.

### Toimenpiteen onnistumiseksi noudata seuraavia ohjeita:

Jos toimenpide on tehty ruokatorven kautta, ole syömättä ja juomatta toimenpiteen jälkeen kaksi tuntia klo \_\_\_\_\_ saakka.

- syö haaleita liemiruokia toimenpidepäivänä
- toimenpidettä seuraavana päivänä voit ruokailla normaalisti

Jos toimenpide on tehty peräsuolen kautta voit syödä ja juoda normaalisti.

### Ota yhteyttä, jos sinulle tulee seuraavia oireita:

- lämmönnousua
- verioksentelua
- voimakasta kipua rintakehän tai vatsan alueelle
- heikottavaa oloa
- verisiä tai mustia ulosteita
  
- arkisin kirurgian poliklinikalle p. 014 269 1424 klo 9–11 ja 12–14
- muuna aikana päivystyspoliklinikalle p. 116 117
- omaan terveyskeskukseen

Jos olet saanut toimenpiteen yhteydessä kipua hoitavaa tai rauhoittavaa lääkitystä, et saa ajaa moottoriajoneuvolla 12 tuntiin toimenpiteen jälkeen.

**Ota tämä ohje mukaan asioidessasi ongelmatilanteissa sairaalassa tai terveyskeskuksessa.**