

Lantion alueen sädehoito

Hoitoa annetaan yksilöllisesti tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Sädehoidon vaikutus on paikallinen.

Annossuunnittelusimulointiin ja sädehoitoon valmistautuminen

- Virtsarakossa tulisi olla virtsaa aina saman verran
- Virtsaa 1 tunti ennen annossuunnittelusimulointia/sädehoitoa ja juo 2 lasillista vettä. Älä pidätä pidempään, äläkä juo enempää.
- **Tämän jälkeen ole virtsaamatta annossuunnittelusimulointiin/sädehoitoon asti.**
- Noudata tätä rakon täyttöohjetta ennen annossuunnittelusimulointia ja jokaista sädehoitoa

Sivuvaikutuksia

Sädehoidosta saattaa tulla sivuvaikutuksia, jotka ovat yksilöllisiä ja ohimeneviä

- ripuli
- ummetus
- ilmavaivat
- virtsavaivat
- peräaukon ärsytys
- ihon poimu- ja taivealueiden ärsytys

Hoito-ohjeita sivuvaikutuksiin

Kerro oireista hoitajalle lisähoito-ohjeiden saamiseksi.

Ripulia, ummetusta ja ilmavaivoja voit hoitaa apteekista ilman reseptiä saatavilla lääkkeillä, ellei lääkäri tee reseptiä lääkettä varten.

Lantion poimu- ja taivealueiden ihon hoitoon saat ohjeet hoitajilta.

Tarvittaessa pääset lääkärin vastaanotolle