

Lapsen botuliinihoito esilääkityksessä ja/tai ilokaasun avulla

Lapsellanne on todettu lihaskireyksiä ja niitä helpottamaan voidaan käyttää Botuliinihoitoa. Botox-injektiot annetaan hyvin pieninä annoksina lihakseen, tarkkaan valittuihin kohtiin. Pistoshoito saa lihaksen rentoutumaan.

Lapsellenne on varattu aika ilokaasun ja/tai esilääkkeen avulla tehtävää Botuliinihoitoa varten.

Valmistautuminen

Hoitopäivän aamuna lapsi saa syödä ja juoda normaalisti, myös käytössä olevat lääkkeet saa ottaa. Jos lapsella on yskää, nuhaa, kurkkukipua tai kuumetta, toimenpide joudutaan siirtämään. Ota tällöin yhteys Lastenneurologian poliklinikkaan.

Lastenneurologi ja fysioterapeutti ovat jo ennalta suunnitelleet pistopaikat.

Lapsi saa ennen toimenpidettä tarvittaessa esilääkettä (Midatsolaami) ja toimenpiteen aikana ilokaasua, joka antaa lyhytaikaisen kivunlievityksen sekä rauhoittaa ja rentouttaa. Ilokaasun sivuvaikutuksena voi esiintyä pahoinvointia ja huimausta, mutta ne ovat harvinaisia ja nopeasti ohimeneviä sivuvaikutuksia.

Botuliinihoito kestää noin 20 minuuttia, vanhemmat voivat olla lapsen vierellä hoidon ajan. Lapsi saa myös olla omissa vaatteissaan (väljä vaatetus) ja hän voi ottaa mukaan lempilelun tai katsoa lastenohjelmia hoidon aikana.

Hoidon jälkeen

Syöminen ja juominen on mahdollista heti toimenpiteen jälkeen. Omat eväät voi ottaa mukaan. Jos lapsi on saanut esilääkkeen, niin hänen vointiaan seurataan 1 h ajan toimenpiteen jälkeen.

Pistoskohdissa voi tuntua kipua ja sitä lievittämään voidaan antaa Parasetamolia tai Ibuprofeenia.

Lastenneurologian fysioterapeutti/toimintaterapeutti suunnittelee yhdessä lapsen oman fysioterapeutin/toimintaterapeutin kanssa yksilöllisen suunnitelman kuntoutukseen.

Jos sinulla on kysyttävää, voit olla yhteydessä Lastenneurologian poliklinikkaan (014) 269 2308 (arkisin klo 8-12:15).