

Lisäkilpirauhasleikkaukseen tulevalle

Lisäkilpirauhasten liikatoiminta

Lisäkilpirauhasen poistoleikkaus tehdään lähes aina liikatoiminnan vuoksi. Lisäkilpirauhasten liikatoiminta todetaan verikokeilla, joissa havaitaan, että veren kalsiumpitoisuus ja lisäkilpirauhashormonipitoisuus ovat lisääntyneet.

Lisäkilpirauhasten liikatoiminta voi aiheuttaa seuraavia oireita:

- väsymystä, heikkoutta, masennusta
- pahoinvointia, vatsakipuja, ummetusta
- janon lisääntymistä, virtsanerityksen lisääntymistä, virtsatiekiviä
- luustonmuutoksia, luustosärkyjä
- sydämen rytmihäiriöitä, verenpaineen nousua

Jos lisäkilpirauhasen liikatoimintaa ei hoideta, se voi aiheuttaa pysyviä vaurioita luustossa, munuaisissa, verenkiertoelimissä ja aivoissa.

Leikkaushoito

Lisäkilpirauhasen poistoleikkaus tehdään nukutuksessa. Leikkaus kestää keskimäärin kaksi tuntia. Sairaalassa ollaan yleensä yksi vuorokausi leikkauksen jälkeen.

Leikkaushaava tulee kaulan alaosaan. Kaulalla on tavallisimmin neljä lisäkilpirauhasta. Liikatoiminnassa yksi tai useampi rauhasista on suurentunut. Yleensä poistetaan yksi suurentunut rauhanen, joskus useampia. Onnistuneen leikkauksen jälkeen veren kalsium- ja lisäkilpirauhashormonipitoisuudet normalisoituvat 95%:lla leikatuista, 5%:lle joudutaan tekemään uusintaleikkaus.

Leikkaus on turvallinen. Äänihuulihieron vaurio ja tilapäinen tai pysyvä äänenkäheys tulee yhdelle prosentille potilaista. Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta, jota hoidetaan lääkkeillä, on yhtä harvinainen.

Leikkauksesta toipuu yleensä nopeasti. Työssäkäyvät saavat 2 viikkoa sairauslomaa.

Tarvittaessa voit ottaa yhteyttä korva-, nenä- ja kurkkutautien poliklinikalle arkisin klo 8:00-14:00 p. 014 269 5766, iltaisin ja viikonloppuisin operatiivisille sairaansijoille p. 014 269 1015.