

Mesalatsiini-lääkeohje tulehduksellisissa suolistosairauksissa

Asacol®, Pentasa®, Salofalk®, Mesalazin®

Vaikutustapa

- Mesalatsiinilla on suolen tulehdusta vähentävä vaikutus ja sitä käytetään tulehduksellisten suolistosairauksien hoidossa.
- Lääkkeen vaikutus alkaa melko nopeasti, yleensä vaikutusta näkyy jo noin viikossa.

Annostus

- Mesalatsiinia voidaan annostella sekä suun kautta tabletteina tai rakeina (annosraepussit) että paikallisesti peräsuoleen peräpuikkoina tai -ruiskeina.
- Paksusuolen loppuosan tulehdukseen saadaan paras teho paikallisesti annosteltavilla lääkkeillä, kun taas suun kautta otettu lääke tehoaa paremmin paksusuolen alkuosien tulehdukseen. Eri annostelumuotoja käytetään usein myös yhtä aikaa parhaan tehon saavuttamiseksi.
- Mesalatsiinin maksiannos on 4-4.8g/vrk. Ylläpitovaiheessa pidempikestoisen remission jälkeen pienempikin lääkeannos voi olla riittävä, esim. 2.4-3.2g/vrk. Lääkäri arvioi sopivan annoksen yksilöllisesti tilanteen mukaan.

Sivuvaikutukset

- Mesalatsiinin tavallisimpina haittoina mainitaan päänsärky ja ihottuma. Joskus lääke voi myös aiheuttaa ripulia. Harvinaisempina haittoina voi kehittyä munuaisen toimintahäiriö, maksa-arvojen nousua tai verenkuvamuutoksia.

Turvakokeet

- Mesalatsiinihoidon aikana verikokeet tarkistetaan 1 ja 4kk kuluttua hoidon alusta ja sen jälkeen vakaassa tilassa verikokeet tarkistetaan vuosittain.

Raskaus ja imetys

- Mesalatsiinia voidaan käyttää raskauden ja imetyksen aikana.

Rokotukset

- Kansallisen rokotusohjelman mukaisten rokotusten olisi hyvä olla ajan tasalla ennen hoidon aloitusta.
- Influenssa-rokote kannattaa ottaa vuosittain.