Metyylifenidaatti, säädellysti vapauttava kapseli (Medikinet CR®)

Käyttöaihe

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön (ADHD) hoito. Lääkehoidon tavoitteena on lievittää oireiden aiheuttamaa haittaa ja parantaa toimintakykyä. Hoidolle kannattaa asettaa konkreettinen tavoite, jotta hoidon onnistumista voidaan mitata. ADHD:n asianmukainen hoito voi parantaa merkittävästi opiskelu-, työ- ja toimintakykyä.

Vaikutustapa

Metyylifenidaatti kuuluu keskushermostoa stimuloiviin lääkkeisiin. Sen vaikutus perustuu aivojen dopamiini- ja noradrenaliinivälitteisten hermoratojen aktivaatioon, mikä saa aikaan oireita lievittävät vaikutukset (mm. tarkkaavuuden ja keskittymiskyvyn parantuminen, impulsiivisuuden väheneminen).

Tämä säädellysti lääkeainetta vapauttava kapseli koostuu lääkeaineen heti vapauttavasta komponentista (50 % annoksesta) ja lääkeainetta hitaasti vapauttavasta komponentista (50 % annoksesta) → lääkevaikutus painottuu aamuun. Lääkkeen kokonaisvaikutusaika on 8–10 tuntia.

Annostus

Lääkärin ohjeen mukaan. Annostus vaihtelee potilaan iän, painon ja yksilöllisen vasteen mukaan. Lääkehoito aloitetaan pienellä annoksella ja tarpeen mukaan annosta nostetaan vähitellen.

Lääkehoito toteutetaan pienimmällä mahdollisella vuorokausiannoksella, jolla saavutetaan riittävä oireiden hallinta. Pitkäaikaisen käytön lopetus voi olla hyvä tehdä asteittain annosta pienentäen, lääkärin ohjeen mukaan.

Lääkkeen ottaminen

Kapselit otetaan aterian yhteydessä tai heti sen jälkeen, jotta lääkkeestä saadaan riittävän pitkäkestoinen vaikutus. Lääke otetaan kerran (aamiaisella) tai kaksi kertaa vuorokaudessa (aamiaisella ja lounaalla). Kapselit niellään kokonaisina nesteen kera.

Tarvittaessa kapseli voidaan avata ja sekoittaa koko kapselin sisältö ruokalusikalliseen kylmää pehmeää ruokaa (esim. jogurtti, omenasose). Koko seos on nautittava heti nesteen kera, eikä sitä saa säilyttää myöhempää käyttöä varten. Kapseleita tai kapselin sisältöä ei saa pureskella tai murskata, sillä se vaikuttaa kapselin toimintaan.

Tämä lääke on reseptilääke, joka on tarkoitettu vain sinun henkilökohtaiseen käyttöösi.

Jos unohdat ottaa lääkkeen

Jos annos unohtuu, odota seuraavaan ottoajankohtaan ja ota annos tavanomaiseen aikaan. Älä ota kaksinkertaista annosta korvaamaan unohtunutta annosta.

Käytössä huomioitava

- Lääkehoidon aikana tulee välttää alkoholin käyttöä (huomioi myös mahdollinen ruoan tai lääkkeiden sisältämä alkoholi), sillä yhteiskäyttö saattaa pahentaa keskushermostoon kohdistuvia vakavia haittavaikutuksia.
- Lääkitys saattaa vaikuttaa ajokykyyn tai koneiden käyttökykyyn (huimaus, uneliaisuus, näköhäiriöt). Noudatettava varovaisuutta, kunnes lääkkeen yksilöllinen vaikutus ajokykyyn on selvillä.
- Lääkehoidon aikana tulee seurata hoitovastetta, verenpainetta ja sykettä, painoa, ruokahalua ja psyykkistä vointia.
- Lääke saattaa aiheuttaa positiivisen tuloksen huumetesteissä, esimerkiksi urheilun yhteydessä tehtävissä testeissä.

Haittavaikutukset

- Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Mahdolliset haittavaikutukset ilmenevät usein lääkehoidon alussa ja ne saattavat lievittyä tai hävitä kokonaan lääkehoidon jatkuessa.
- Tavallisimpia haittavaikutuksia ovat heikentynyt ruokahalu, johon liittyy lapsilla heikentynyt painon kehitys ja pituuskasvu, pahoinvointi, suun kuivuus, kurkunpään ja nenän tulehdus, päänsärky, liikahikoilu, mahavaivat, ärtyisyys, aggressiivisuus, vapina, huimaus, hermostuneisuus sekä univaikeudet. Lievä sykkeen tihentyminen ja verenpaineen kohoaminen on tavallista, mutta näillä ei yleensä ole merkitystä perusterveiden ihmisten hoidossa.

Milloin yhteys hoitavaan tahoon? (Hätätilanteessa soitto 112)

- Jos oireet eivät lievene, vaikka lääkettä on käytetty kuukauden ajan annosta asianmukaisesti säätäen.
- Jos oireet pahenevat tai ilmenee vakavia haittavaikutuksia (mainittu pakkausselosteessa).
- Mikäli ilmenee sydänoireita (esim. rintakipu, pyörtyily, hengenahdistus), psykoottisia oireita tai maniaa, näön hämärtymistä tai muita näköhäiriöitä.

Yhteisvaikutukset

- Kaikkien muiden lääkkeiden, luontaistuotteiden ja ravintolisien samanaikaisesta käytöstä on keskusteltava lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa.
- Luontaistuotteista mäkikuisma saattaa heikentää lääkehoidon tehoa.
- Lääkettä ei tule käyttää närästys- ja vatsansuojalääkkeiden kanssa (H_2-reseptorin salpaajat, protonipumpun estäjät, antasidit) ilman lääkärin ohjeistusta, vaarana lääkeaineen liian nopea vapautuminen.

Säilytys

Säilytä alkuperäispakkauksessa, valmiste on herkkä kosteudelle.