

# Munatorvien aukiolotutkimus

## Hysterosalpingosonografia (HSSG)

- HSSG on ultraäänitutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää munatorvien aukiolo ja tutkia tarkemmin kohdun rakennetta.
- Ennen HSSG -tutkimusta mieheltä on tutkittu siemennestenäyte.
- Kun kuukautiset alkavat, varaa aika HSSG-tutkimusta varten.
- Tutkimus voidaan tehdä alkukierrosta ennen ovulaatiota, viimeistään kierron 12. päivä.
- Kuukautisvuodon tulee olla loppunut tutkimuspäivään mennessä. Mikäli sinulla on tulehdusoireita (esim. poikkeavasti pahanhajuista valkovuotoa), asiasta on hyvä mainita hoitajalle aikaa varatessasi.
- Tutkimus saattaa aiheuttaa jonkin verran kuukautiskivun kaltaista tuntemusta. Tutkimusta edeltävästi voit ottaa kipulääkettä, esim. Panadol® 1 g ja/tai Burana® 400 – 800 mg noin tuntia ennen vastaanottoa.
- Tutkimuksessa ruiskutetaan ohuen katetrin avulla kohtuonteloon keittosuolaliuosta ja ilmaa. Samanaikaisesti seurataan ultraäänellä ilmakuplien kulkua munatorvia pitkin munasarjan viereen ja tutkitaan kohtuontelon rakenne. Toimenpide on lyhytkestoinen.

## Mahdollisia sivuvaikutuksia

- Tutkimuksen jälkeen voi esiintyä tiputteluvuotoa muutaman päivän ajan ja joskus ohimenevää, vaaratonta hartiapistosta (kohdun kautta vatsaonteloon mennyt neste voi aiheuttaa vatsakalvolla ärsytystä, joka tuntuu hartiapistoksena).

Naistentauti- ja äitiisyksikkö, lapsettomuuspoliklinikka

Puh. 014 269 1023 ma-pe klo 8.00-14.00.