KESKI-
SUOMEN
HYVINVOINTI-
ALUE

Peritoneaalidialyysikatetrin laitto

Peritoneaalidialyysihoidolla (=vatsakalvodialyysi) puhdistetaan elimistöä kuona-aineista ja poistetaan nestettä, kun oma munuaistoiminta on heikentynyt. Ennen hoidon aloittamista tehdään nukutuksessa pieni leikkaus, jossa asetetaan ihon läpi vatsaonteloon ohut silikonikatetri. Sairaalassa toimenpiteen takia viivytään noin 3 päivää.

Huomioi kotona viikkoa ennen leikkausta

- Ummetus estää katetrin toimintaa ja lisää tulehdusriskiä, joten ota säännöllisesti aamuin illoin Pegorion 12 g jauhetta sekoitettuna lasilliseen vettä. Jauhetta saa apteekista ilman reseptiä.
- Yskiminen voi huonontaa katetrin kiinnittymistä oikeaan asentoon. Ilmoita osastolle, jos sinulla on hankalaa yskää, tarvittaessa leikkausta siirretään.
- Vatsan ihon tulisi olla hyvässä kunnossa, jotta tulehdusriski olisi mahdollisimman pieni. Jos käytät insuliinia, pistä se alavatsaan.
- Saat reseptin Bactroban nasal- voiteesta, jota pitäisi laittaa molempiin sieraimiin kaksi kertaa vuorokaudessa, noin viikon ajan ennen leikkausta. Tällä estetään haitallisten nenäbakteerien siirtyminen leikkaushaavoihin, jossa ne voivat aiheuttaa tulehduksen.

Valmistelut osastolla ennen leikkausta

Sairaalaan tulet leikkausta edeltävänä päivänä. Verikokeet ja ekg otetaan edeltävästi. Osastolla hoitaja keskustelee kanssasi leikkausvalmisteluista ja jälkihoito-ohjeista. Tarvittaessa saat ulostuslääkettä tai peräruiskeen. Saat ohjeet käydä suihkussa illalla sekä leikkausaamuna. Leikkausaamuna ennen toimenpidettä et saa syödä tai juoda, lääkkeitä saat ottaa lääkärin ohjeen mukaan. Potilaskuljettaja vie sinut sängyllä leikkaussaliin.

Leikkauksen jälkeen osastolla

Leikkauksen jälkeen saat syödä ja juoda vapaasti, sekä liikkua voinnin mukaan. Tarvittaessa saat kipulääkettä haavakipuun. Hoitaja huuhtelee katetria ja tarkistaa haavan siteet, niitä ei avata viikkoon. Leikkaushaava pidetään kuivana ensimmäisen viikon ajan, suihkussa voit käydä leikkausalue suojattuna. Jotta katetri kiinnittyisi mahdollisimman hyvin, vatsan tulee toimia päivittäin ja raskaiden

taakkojen nostamista tulee välttää. Nostorajoitus on 2 viikon ajan leikkauksesta 2 kg, sen jälkeen 10 kg. Jatka kotona Pegorionin käyttöä säännöllisesti. Hoidon aloitus suunnitellaan 2–4 viikon päähän.

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä Pd-hoitajaan: arkisin klo 8–15 p. 014-269 5294 tai muina aikoina sisätautien osastolle p. 014-2691 011