

# KELIAKA PLEXUS HERMOJUURIBLOKADI TIETOKONETOMOGRAFIA (TT)-OHJAUKSESSA

## Esivalmistelut

- Mikäli käytössäsi on verenhennuslääkitys, esim. **Marevan-, Warfarin-, Clopidogrel-, Plavix-, Efient-, Eliquis-, Pradaxa-, Tiklyd-, Lixiana- tai Xarelto-lääkitys**, on lääkitys keskeytettävä ennen toimenpidettä. Keskeytysohjeet on kysyttävä lähettävästä yksiköstä.
- PVK- ja INR-arvot on kontrolloitava edeltävänä päivänä. INR-arvon on oltava alle 2, jotta toimenpide voidaan suorittaa.
- Käytössä olevat lääkkeet voit ottaa normaalisti, paitsi verenhennuslääkitys lähettävän yksikön ohjeiden mukaisesti.
- Ennen tutkimusta on oltava ravinnotta neljä (4) tuntia ennen tutkimusta. Vettä ja mehua voi juoda vähän.
- Puuduteaineilyherkyydestä tulee ilmoittaa kuvantamisyksikköön ennen toimenpidettä.
- Ilmoittautuminen Sairaala Novan osastolla \_\_\_\_\_ määräaikana, josta teidät ohjataan toimenpiteeseen kuvantamisyksikköön.

## Yleistä

Toimenpiteen aikana tulee olla makuuasennossa vatsalla tai selällään tutkimuspöydällä. Ennen toimenpidettä annetaan kevyt esilääkitys ja kipulääkettä tarpeen mukaan. Toimenpiteessä lääkäri vie TT-ohjauksessa neulan lähelle kipua aiheuttavia hermoja ja ruiskuttaa kipua salpaavan lääkituksen.

Toimenpide kestää noin 45 minuuttia.

Toimenpiteen jälkeen on oltava tarkkailussa osastolla seuraavaan aamuun asti. Tutkimustulokset saat hoitavalta lääkäriltä.

## Muuta huomioitavaa

**Ota yhteys lähettävään yksikköön, mikäli annettu aika ei sovi tai mikäli on kysyttävää verenhennuslääkityksen keskeytyksen suhteen.** Käyttämättä ja peruuttamatta jääneestä ajasta joudumme perimään erikseen määrätyn maksun. Jos epäilet olevasi raskaana, ota yhteys lähettävään yksikköön. Tutkimuksen pyytänyt lääkäri harkitsee, voidaanko tutkimus suorittaa.

**Jos haluat kysyä jotain muuta tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. 040 3508322 klo 8.30 – 10.30.**