

SELKÄYDINKANAVAN VARJOAINEKUVAUS (TT-MYELOGRAFIA)

Valmistautuminen

- Käy laboratoriossa verikokeessa ennen toimenpidettä 14 vrk sisällä, mikäli saamassasi kirjessä on laboratoriolähete (PVK, P-Krea).
- Mikäli käytössäsi on verenhennuslääkitys, esim. Marevan-, Warfarin-, Plavix-, Clopidogrel, Efient-, Eliquis-, Pradaxa-, Ticlyd-, Lixiana- tai Xarelto-lääkitys, on lääkitys keskeytettävä ennen toimenpidettä. **Mikäli sinulla on sydämen keinoläppä, ota yhteys lähettävään yksikköön puh. _____**
- Jos käytät Marevania tai Warfarinia, käy tutkimusta edeltävänä päivänä laboratoriossa. INR-arvon on oltava alle 2, jotta tutkimus voidaan tehdä.
- Selvitä verenpainetasosi. Verenpaineen tulee olla alle 160/90. Tarvittaessa ota yhteyttä omaan terveysasemaasi.
- Tutkimusaamuna on oltava ravinnotta, vettä ja mehua voit juoda vähän.
- Käytössäsi olevat lääkkeet voit ottaa, paitsi verenhennuslääkitys lähettävän yksikön ohjeiden mukaisesti.
- **Ilmoittaudu sovittuna aikana Sairaala Novan Hoitokeskuksessa. _____**
- Saapuessasi Sairaala Novaan ilmoittaudu itseilmoittautumisautomaateilla, jotka opastavat sinut hoitokeskukseen.

Tutkimuksen kulku

Hoitokeskuksessa saat sairaalavaatteet ja vuodepaikan. Potilaskuljettaja hakee sinut tutkimukseen siihen sopivana ajankohtana aamupäivän kuluessa. Tutkimus tapahtuu siten, että lääkäri pistää läpivalaisuohjauksessa paikallispuudutuksessa selkäydinkanavaan ohuen neulan ja ruiskuttaa varjoainetta selkäydinkanavaan. Läpivalaisuissa tutkimus kestää noin 30 minuuttia. Tämän jälkeen tehdään CT-kuvaus, joka kestää noin 10 minuuttia.

Jälkihoito

Mahdollisten jälkivaikutusten (esim. päänsärky) ehkäisemiseksi varjoaineen laiton jälkeen sinun on oltava vuodelevossa ja osastoseurannassa 2 tuntia vuoteen pääpuoli koholla noin 30°. Seurannan jälkeen voit kotiutua. Tupakointi on kielletty tutkimuspäivän iltaan asti. Tutkimustulokset saat hoitavalta lääkäriltä.

Muuta huomioitavaa

Ota yhteyttä lähettävään yksikköön, mikäli annettu aika ei sovi tai mikäli sinulla on kysyttävää verenhennuslääkityksen keskeytyksen suhteen puh. _____ Peruuttamatta jääneestä ajasta peritään ennalta määrätty maksu.

Jos epäilet olevasi raskaana, ota yhteys lähettävään yksikköön. Tutkimuksen pyytänyt lääkäri harkitsee, voidaanko tutkimus suorittaa. Jos olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai mikäli haluat kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. **040 3508322 klo 8.30 – 10.30.**