

COLON TRANSIT-TIME (paksusuolen läpikulkuajatutkimus), terveyskeskuksessa kuvattava potilas

Tutkimuksessa käytetään **Sitzmarks**-nimisiä röntgenpositiivisia kapseleita. Yhdessä kapselissa on 24 merkkiä.

Valmistautuminen tutkimukseen

Saat kolme (3) erilaista kapselia, jotka otetaan numeroidussa järjestyksessä peräkkäisinä päivinä. Tutkimuksen onnistumisen kannalta on erittäin tärkeää, ettette käytä samanaikaisesti mitään ulostuslääkkeitä, pienois- eikä vesiperä-ruiskeita. Mikäli käytössä on jotain em. lääkkeitä on niiden käyttö lopetettava **neljä (4) päivää** ennen **Sitzmark**-tablettien ottamista, eli ____/____. Muut käyttämänne lääkkeet voitte ottaa normaalisti.

1. päivänä otetaan kapseli n:o 1 ____/____ klo _____
2. päivänä otetaan kapseli n:o 2 klo ____/____ klo _____
3. klo _____ päivänä otetaan kapseli n:o 3 ____/____ klo _____

Ilmoittaudu _____ terveyskeskuksen kuvantamiseen 4. päivänä varattuna aikana. Tällöin röntgenhoitaja ottaa suoliston alueelta röntgenkuvan. Tutkimusta jatketaan 7. päivänä vain siinä tapauksessa, mikäli merkkejä on vielä suolistossa 50 tai enemmän. Tutkimus kestää noin 15 minuuttia. Tutkimustulokset saatte teitä hoitavalta lääkäriltä.

Ottakaa yhteyttä lähettävään yksikköön mikäli annettu aika ei sovi puh. _____

Jos olet raskaana, olet yliherkkä jodivarjoaineelle tai mikäli haluat muuten kysyä jotain tutkimukseen liittyvää, voit ottaa yhteyttä kuvantamisyksikköön puh. (014) 269 2739 klo 8.00 – 15.00.