

Sähkösilmutka-eli LOOP-hoito-

Potilasohje

Kohdunsuun koepaloissa on todettu solumuutos. Muutoskohta hoidetaan poistamalla se polikliinisesti paikallispuudutuksessa.

Ottakaa tunti ennen toimenpidettä

- Ibuprofeenia 800mg esim. Burana[®], Ibusal[®], Ibuxin[®] (2kpl 400mg tablettia) ja
- Paracetamolia 1g esim. Panadol[®], Para-tabs[®] (2 kpl 500mg tablettia).

Toimenpide tehdään vuotamattomana ajankohtana. Mikäli kuukautiset sattuisivat toimenpideajankohdaksi, vaihda aikaa.

Toimenpiteen jälkeen voi esiintyä tiputteluvuotoa parin viikon ajan. Jos se muuttuu kuukautisvuotoa runsaammiksi tai ilmaantuu tulehdusoireita (kuume, kipu, haju) ottakaa yhteys Naistentauti- ja äitiysyksikköön.

Hoidettuun kohtaan muodostuu pieni rupi, kuten mihin tahansa avohaavaan. Tämä rupi irtoaa keskimäärin kahden viikon kuluttua hoidosta, jolloin saattaa kerralla tulla runsaampi määrä kirkasta verta. Tämän irtoamisvuodon tulisi rauhoittua pian itsestään.

Sairausloman tarvetta ei yleensä ole.

Vältäkyä yhyntää, uimista ja tamponin käyttöä jälkivuodon ajan.

Patologi tutkii otetun näytteen.

Tulokset ja jatkohoito-ohje ovat nähtävissä Oma Kannassa.

Yhteystiedot

- Naistentauti- ja äitiisyksikkö ma-pe klo 8–14 p. 014 269 1023
- Synnytysyksikkö päivystysaikana p. 014 269 1204

Lähde: <https://www.terveyskyla.fi/naistalo/gynekologinen-terveys/kohdunsuun-irtosolumuutokset>

Linkki suoraan: [Kohdunsuun irtosolumuutokset Papa](#)