

Spirometriatutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää keuhkojen toimintaa ja ilman virtausta hengitysteissä.

Tutkimukseen valmistautuminen:

Lapsi ottaa normaalisti hoitavan astmalääkkeen tutkimuspäivänä. Jos lapsella on käytössä yhdistelmävalmiste (Symbicort, Seretide) tai pitkävaikutteinen avaava lääke (Formoterol, Oxis, Serevent), myös sen voi ottaa tutkimuspäivän aamuna tavalliseen tapaan.

Raskasta ateriaa on vältettävä 2 tuntia ennen tutkimusta. Kolajuomia, kahvia ja teetä ei saa nauttia 2 tuntiin. Tupakoida ei saa 4 tuntiin ennen tutkimusta.

Tutkimusta ei tehdä kuumeiselle ja flunssaiselle.

Lääketauko:

12 tuntia Avaava astmalääke esim. Airomir, Atrovent, Bricanyl, Buventol, Ventilastin, Ventoline

2 vrk Aminocont, Atrovent comp, Nuelin, Redol comp, Retafyllin, Theofol

Tutkimuksen kulku

Tutkimuksessa lapsi istuu ja hengittää/ puhaltaa suukappaleen kautta spirometrialaitteeseen.

Tutkimus on kivuton.

Tutkimuksen kesto

Varatkaa aikaa noin tunti.

Jos teillä on kysyttävää tutkimuksesta, voitte soittaa Lastentautien poliklinikalle puh. 014 269 1224 (klo 8–13).

