

Päiväkirurgiseen silmätoimenpiteeseen tulevalle (Takaosakirurgia)

Tutustu huolella ohjeisiin

Valmistautuminen toimenpiteeseen:

Jos sinulla on verenpaine-, sydän- tai sokeritauti tai jokin muu sairaus, sen tulee olla leikkaukseen tullessa hyvällä hoitotasolla. Ota tarvittaessa yhteys omaan lääkäriisi hyvän hoitotason saavuttamiseksi. **Verenpaine tulee mitata vähintään viikkoa ennen leikkaukseen tuloa.**

Varmista, että silmätippojen tiputtaminen onnistuu toimenpiteen jälkeen joko itseltäsi ja/tai omaisten ja kotipalvelun avulla.

Terveydentilan esitietolomake tulee täyttää mahdollisimman pian ohjeen mukaan.

Ota mukaan optikkoliikkeestä saamasi kortti, josta selviää silmälasiesi vahvuudet.

Hajusteiden käyttö toimenpideaamuna ei ole suotavaa. Vältä kasvojen ehostusta. Poista tekoripset/ripsipidennykset viimeistään 2 viikkoa ennen leikkausta. Niiden laittamista ei suositella ennen kuin hoitoon kuuluvat silmätippalääkitykset ovat ohi. Kynsilakka, teko- ja geelikynnet tulee poistaa. Jätä kellot, ym. korut kotiin. Sairaala ei vastaa arvoesineistä.

Toimenpidepäivänä ei saa ajaa autoa. Varaudu siihen, että ajokielto voi kestää muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Tarkemmat ohjeet ajokiellosta saat leikkaavalta lääkäriltä.

Jos käytät silmänpainelääkitystä, tiputa tipat normaalisti, myös toimenpideaamuna.

Lääkitys:

Kalaöljyvalmisteet on lopetettava viimeistään 2 viikkoa ennen leikkausta. Muiden lääkkeiden tauottamisesta saat erilliset ohjeet soittoajalla.

Sinun tulee olla syömättä ja juomatta edellisestä illasta klo 24 lähtien.

Varaudu tarvittaessa jäämään sairaalaan vähintään yhdeksi yöksi.

Ota omat lääkkeet mukaan.

Jälkitarkastuksia on yleensä kaksi: ensimmäinen leikkauksen jälkeisenä päivänä ja toinen kuukauden kuluttua leikkauksesta.

KOTIHOITO-OHJEET SILMÄN TAKAOSALEIKKAUKSEN JÄLKEEN:

Suojakilpeä, jonka sait mukaan sairaalasta, pidetään viikon ajan öisin. Sen kiinnittämiseen osta apteekista ihoteippiä.

Voit tarvittaessa puhdistaa silmäluomet kevyesti pyyhkimällä esim. hanaveteen kostutetuilla vanulapuilla. Pyyhkimissuunta on silmän ulkonurkasta sisänurkkaan päin.

Oftan Dexa-Chlora ja Nevanac -tippoja (tai muita lääkärin määräämiä lääkkeitä) laitetaan leikattuun silmään lääkärin erillisen ohjeen mukaan. Tipat aloitetaan leikkausta seuraavana päivänä kontrollin jälkeen kotona. Resepti kirjoitetaan leikkauspäivänä. **Pese kädet aina ennen luomien puhdistamista ja silmätippojen tiputtamista.**

Jos käytät silmänpainelääkitystä tai muita silmälääkkeitä, tiputa tipat normaalisti.

Silmässä voi olla punoitusta, kaiherrusta, kirvelyä, kutinaa, roskan tunnetta ja lisääntyntä kyyneleritystä. Oireita helpottamaan voit käyttää geelimäistä kostutustippaa kertakäyttöpipeteistä, joita saa apteekista ilman reseptiä. Vältä silmän turhaa koskettelua ja hankaamista.

Lievä turvotus silmäluomissa on tavallista leikkauksen jälkeen.

Vuorokauden kuluttua leikkauksesta voit käydä suihkussa normaalisti. Vältä kuitenkin **neljän viikon** ajan saunomista, uimista ja pesuveden joutumista silmään. Vältä raskasta ponnistelua vaativaa työtä ja kumartelua. Myös luomikosmetiikkaa tulee välttää.

Leikkauksen jälkeen sairauslomaa tulee yleensä noin 4 viikkoa.

Jos silmään on leikkauksessa laitettu kaasua tai silikoni, on normaalia, että näkökyky on huono.

Jos sinulle on määrätty leikkauksen jälkeen **asentohoito**, sen noudattaminen on tärkeää hyvän hoitotuloksen aikaansaamiseksi.

Voit matkustaa normaalisti, mutta kaasun laiton jälkeen lentokoneella matkustaminen on kielletty niin kauan kuin näet silmässäsi kaasukuplan.

Leikatun silmän toipuminen on hidasta.

Jos leikattuun silmään tulee kovaa kipua, rähmimistä, näön heikkenemistä tai näkökenttään tulee tumma, liikkumaton varjo, ota yhteyttä:

Sairaala Nova Silmäyksikkö, puh. 014 269 1113 ma-pe klo 8.00-14.00 osastonsihteeri/sairaanhoitaja. Muuna aikana ota yhteys omaan terveyskeskukseen.