

Vepesid® 50 mg

Tässä ohjeessa neuvotaan etoposidi (Vepesid®) kapselien ottaminen KARE (karboplatiini-etoposidi) syöpälääkehoidon yhteydessä.

Annostus ja antotapa

Ota Vepesid® -kapselit tyhjään vatsaan. Edeltävästä ateriasta tulee olla kulunut kaksi tuntia. Tunnin päästä kapselien ottamisesta voit syödä. Yli 200 mg:n annokset jaetaan 2(-4) antokertaan. Annostelu on merkattu alla olevaan taulukkoon.

Vepesid® suun kautta päivinä 1–3

		annos kapseleina	otettu merkintä
pv 1	Aamu (sairaalassa)		
	Ilta		
pv 2	Aamu		
	Ilta		
pv 3	Aamu		
	Ilta		

Vepesid® suun kautta päivinä 2–3

		annos kapseleina	otettu merkintä
pv 1	suonen- sisäisesti		
pv 2	Aamu		
	Ilta		
pv 3	Aamu		
	Ilta		

Pahoinvoinnin estolääkitys

Voit ottaa sinulle määrätyn pahoinvoinnineläkkeen (esim. Metoclopramide®, Ondansetron®, Dexametason®) noin puoli tuntia ennen Vepesid® kapselien ottamista.

pv	lääke ja vahvuus	annos	lisätieto

Säilytys ja käsittelyohje

Lääkkeet saat reseptillä apteekista. Säilytä kapselit huoneenlämmössä alkuperäispakkauksessa. Käsitellessäsi kapseleita suosittelemme käsineiden käyttöä ja käsien pesua saippualla ja vedellä kapseleiden käsittelyn jälkeen. Varoaika lääkeaineen erittymisessä virtsaan on 4 vuorokautta ja ulosteeseen 7 vuorokautta.