

Raskauden aikainen mini-ASA lääkitys

Sinulle on aloitettu mini-ASA lääke, kyseessä on Asetyyლისისყილიჰაპო.

Lääke aloitetaan alkuraskaudessa raskausviikoilla 12–16 tukemaan istukan toimintaa. Lääkkeellä ennaltaehkäistään raskausmyrkytystä (eli pre-eklampsiaa) ja riskiä sikiön kasvuhidastumalle niille odottajille, joilla on raskausmyrkytyksen riskitekijöitä.

Lääkettä on turvallinen käyttää raskausaikana, sen ei ole todettu aiheuttavan haittaa sikiölle tai vastasyntyneelle.

Voit ostaa lääkkeen apteekista ilman reseptiä nimellä Primaspan®, Aspirin®, Disperin® tai ASA-ratiopharm®. **Annostus on yksi 100 mg tabletti kerran vuorokaudessa iltaisin.**

Lääke jatkuu raskausviikolle 36+0 asti. Lääke ei vaikuta synnytyspuudutusten saamiseen.

Jos sinulle tulee veristä vuotoa tai supistuksia, kysy lisäohjeita äitiyksyksiköstä.

Lääkettä ei saa käyttää, jos sinulla on:

- asetyyლისისყილიჰაპო allergia
- sairastettu mahahaava
- verenvuodolle altistava sairaus
- vaikea maksan tai munuaisten vajaatoiminta

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa yhteyttä arkisin äitiyksikköön puh. 014 269 1104 klo 8-14:00.

